

Escala CHA2DS2-VASc: Añadida en documento de revisión de criterios de ACO en la FA

Escrito por Dra. Cristina Gisbert Garzón

Viernes 22 de Octubre de 2010 14:03 - Última actualización Martes 16 de Noviembre de 2010 21:50

Para simplificar la identificación de los factores de riesgo, en la guía, proponen incluir los factores de riesgo no mayores en la escala CHADS2, con lo que la nueva escala, en la que se basan los criterios de anticoagulación sería la siguiente: **CHA2DS2-VASc**, donde:

C: Insuficiencia cardíaca o disfunción VI 1 punto

H: HTA 1 punto

A: Edad ≥ 75 a 2 puntos

D: DM 1 punto

S: Ictus, AIT o tromboembolismo 2 puntos

V: vasculopatía (IMA, arteriosclerosis aórtica o arteriopatía periférica) 1 punto

A: Edad 65-74 años 1 punto

Sc: Sexo Mujer 1 punto

RECOMENDACIONES ACTUALES DE ANTICOAGULACIÓN:

Escala CHA2DS2-VASc: Añadida en documento de revisión de criterios de ACO en la FA

Escrito por Dra. Cristina Gisbert Garzón

Viernes 22 de Octubre de 2010 14:03 - Última actualización Martes 16 de Noviembre de 2010 21:50

- Anticoagulación:

CHA2DS2-VASC > 0 = 2

1 Factor de riesgo mayor

2 o + factores de riesgo clínicamente relevantes no mayores

- AAS o anticoagulación (preferible anticoagulación):

CHA2DS2-VASc = 1

1 factor de riesgo clínicamente relevante no mayor

- Nada o AAS (preferible nada):

CHA2DS2-VASc=0

Ningún factor de riesgo

Escrito por Dra. Cristina Gisbert Garzón

Viernes 22 de Octubre de 2010 14:03 - Última actualización Martes 16 de Noviembre de 2010 21:50

Podéis consultar el documento de revisión modificado en este enlace: [Revisión Criterios de Anticoagulación en la FA según la Guía de la ESC 2010](#)

